


# Resultat från nationella folkhälsoenkäten 2007 - psykisk hälsa Katarina Paulsson, Statens folkhälsoinstitut


## Lätta eller svåra besvär av huvudvärk



**Figur 1.** Andel med besvär av huvudvärk, 16-84 år (2004 18-84 år), 2004-2007. Åldersstandardiserat. Källa: Nationella folkhälsoenkäten *Hälsa på lika villkor?*, Statens folkhälsoinstitut.

Det var vanligare med besvär av huvudvärk bland kvinnor än bland män. Det fanns inga statistiskt säkerställda skillnader mellan åren.


## Ålder



**Figur 2.** Andel med besvär av huvudvärk i olika åldersgrupper, 16-84 år, 2007. Källa: Nationella folkhälsoenkäten *Hälsa på lika villkor?*, Statens folkhälsoinstitut.

Det var mindre vanligt att ha besvär av huvudvärk bland kvinnor och män i åldersgruppen 65-84 år än i övriga åldrar.


## Sysselsättning



**Figur 3.** Andel med besvär av huvudvärk efter sysselsättning, 16-84 år, 2007. Åldersstandardiserat. Källa: Nationella folkhälsoenkäten *Hälsa på lika villkor?*, Statens folkhälsoinstitut.

Det var vanligare med besvär av huvudvärk bland långtidssjukskrivna män och män med sjuk-/aktivitetsersättning än bland yrkesarbetande och arbetslösa män. Det var vanligare med besvär av huvudvärk bland kvinnor med sjuk-/aktivitetsersättning än bland yrkesarbetande kvinnor.


## Socioekonomi



**Figur 4.** Andel med besvär av huvudvärk efter socioekonomi, 16-84 år, 2007. Åldersstandardiserat. Källa: Nationella folkhälsoenkäten *Hälsa på lika villkor?*, Statens folkhälsoinstitut.

Det var vanligare med besvär av huvudvärk bland kvinnor och män i arbetaryrken och tjänstemannaryrken på lägre nivå än bland tjänstemän på mellannivå eller högre.


## Ekonomisk situation



**Figur 5.** Andel med besvär av huvudvärk efter ekonomisk situation, 16-84 år, 2007. Åldersstandardiserat. Källa: Nationella folkhälsoenkäten *Hälsa på lika villkor?*, Statens folkhälsoinstitut.

Det var vanligare med besvär av huvudvärk bland män som var ekonomiskt utsatta än bland män som inte varit ekonomiskt utsatta. Det var vanligare att ha besvär av huvudvärk bland kvinnor som saknade kontantmarginal än bland kvinnor som hade kontantmarginal.

## Utbildning




**Figur 6.** Andel med besvär av huvudvärk efter utbildning, 16-84 år, 2007. Åldersstandardiserat. Källa: Nationella folkhälsoenkäten *Hälsa på lika villkor?*, Statens folkhälsoinstitut.

Det var vanligare att ha besvär av huvudvärk bland män med kort utbildning än bland män med mellanlång eller lång utbildning. Det var mindre vanligt att ha besvär med huvudvärk bland kvinnor med lång utbildning än bland kvinnor med mellanlång eller kort utbildning.

## Födelse land

Andel med besvär av huvudvärk (%)




**Figur 7.** Andel med besvär av huvudvärk efter födelse land, 16-84 år, 2007. Åldersstandardiserat.  
Källa: Nationella folkhälsoenkäten *Hälsa på lika villkor?*, Statens folkhälsoinstitut.

Det var mindre vanligt att ha besvär av huvudvärk bland svenskfödda män och kvinnor än bland personer födda utanför Norden.

## Svåra besvär av ängslan, oro eller ångest

Andel med svåra besvär av ängslan, oro eller ångest (%)




**Figur 8.** Andel med svåra besvär av ängslan, oro eller ångest, 16-84 år (2004 18-84 år), 2004-2007. Åldersstandardiserat. Källa: Nationella folkhälsoenkäten, *Hälsa på lika villkor?*, Statens folkhälsoinstitut.

Det var vanligare att besväras av svår ängslan, oro eller ångest bland kvinnor än bland män. Det fanns inga statistiskt säkerställda skillnader mellan åren.

## Ålder


Andel med svåra besvär av ängslan, oro eller ångest (%)



**Figur 9.** Andel med svåra besvär av ängslan, oro eller ångest i olika åldersgrupper, 16-84 år, 2007. Källa: Nationella folkhälsoenkäten, *Hälsa på lika villkor?*, Statens folkhälsoinstitut.

Det var mindre vanligt att ha svåra besvär av ängslan, oro eller ångest bland kvinnor i åldersgruppen 65-84 år än bland kvinnor yngre än 65 år. I åldersgrupperna 16-29 år och 65-84 år fanns ingen statistiskt säkerställd skillnad mellan män och kvinnor. Det fanns inga statistiskt säkerställda skillnader mellan män i olika åldersgrupper.


## Sysselsättning



**Figur 10.** Andel med svåra besvär av ängslan, oro eller ångest efter sysselsättning, 16-84 år, 2007. Åldersstandardiserat. Källa: Nationella folkhälsoenkäten, *Hälsa på lika villkor?*, Statens folkhälsoinstitut.

Det var mindre vanligt att ha svåra besvär av ängslan, oro eller ångest bland yrkesarbetande i jämförelse med övriga sysselsättningsgrupper. Det var mindre vanligt med svåra besvär av ängslan ångest, oro eller bland yrkesarbetande kvinnor än bland arbetslösa kvinnor och kvinnor med sjuk-/aktivitetsersättning.


## Socioekonomi



**Figur 11.** Andel med svåra besvär av ängslan, oro eller ångest efter socioekonomi, 16-84 år, 2007. Åldersstandardiserat. Källa: Nationella folkhälsoenkäten, *Hälsa på lika villkor?*, Statens folkhälsoinstitut.

Det fanns inga statistiskt säkerställda skillnader mellan olika socioekonomiska grupperna.

## Ekonomisk situation




**Figur 12** Andel med svåra besvär av ängslan, oro eller ångest efter ekonomisk situation, 16-84 år, 2007. Åldersstandardiserat. Källa: Nationella folkhälsoenkäten, *Hälsa på lika villkor?*, Statens folkhälsoinstitut.

Det var vanligare med besvär av ängslan, oro eller ångest bland kvinnor och män som var ekonomiskt utsatta än bland dem som inte var ekonomiskt utsatta.

## Utbildning

Andel med svåra besvär av ängslan, oro eller ångest (%)




**Figur 13.** Andel med svåra besvär av ängslan, oro eller ångest efter utbildning, 16-84 år, 2007. Åldersstandardiserat. Källa: Nationella folkhälsoenkäten, *Hälsa på lika villkor?*, Statens folkhälsoinstitut.

Det var vanligare att ha besvär av ängslan, oro eller ångest bland kvinnor och män med kort utbildning än bland dem med lång utbildning.

## Födelseland

Andel med svåra besvär av ängslan, oro eller ångest (%)




**Figur 14.** Andel med svåra besvär av ängslan, oro eller ångest efter födelseland, 16-84 år, 2007. Åldersstandardiserat. Källa: Nationella folkhälsoenkäten, *Hälsa på lika villkor?*, Statens folkhälsoinstitut.

Det fanns inga statistiskt säkerställda skillnader mellan personer med olika födelseland.

## Svåra besvär av trötthet

Andel med svåra besvär av trötthet (%)




**Figur 15.** Andel med svåra besvär av trötthet, 16-84 år (2004 18-84 år), 2004-2007. Åldersstandardiserat. Källa: Nationella folkhälsoenkäten, *Hälsa på lika villkor?*, Statens folkhälsoinstitut.

Det var mindre vanligt med svåra besvär av trötthet bland kvinnor år 2007 jämfört med år 2004. Kvinnor hade i större utsträckning svåra besvär av trötthet jämfört med män samtliga år.

## Ålder


Andel med svåra besvär av trötthet (%)



**Figur 16.** Andel med svåra besvär av trötthet i olika åldersgrupper, 16-84 år, 2007. Källa: Nationella folkhälsoenkäten, *Hälsa på lika villkor?*, Statens folkhälsoinstitut.

Det var vanligare att ha svåra besvär av trötthet bland kvinnor i åldersgruppen 45-64 år än bland kvinnor i övriga åldersgrupper. Det var vanligare med svåra besvär av trötthet bland män i åldersgruppen 65-84 än bland män i åldersgruppen 30-44 år.


## Sysselsättning



**Figur 17.** Andel med svåra besvär av trötthet efter sysselsättning, 16-84 år, 2007. Åldersstandardiserat. Källa: Nationella folkhälsoenkäten, *Hälsa på lika villkor?*, Statens folkhälsoinstitut.

Det var mindre vanligt med svåra besvär av trötthet bland yrkesarbetande män än bland män med sjuk-/aktivitetsersättning eller män som var arbetslösa. Det var mindre vanligt med svåra besvär av trötthet bland yrkesarbetande kvinnor i jämförelse med kvinnor i övriga sysselsättningsgrupper.


## Socioekonomi



**Figur 18.** Andel med svåra besvär av trötthet efter socioekonomi, 16-84 år, 2007. Åldersstandardiserat. Källa: Nationella folkhälsoenkäten, *Hälsa på lika villkor?*, Statens folkhälsoinstitut.

Det var vanligare med svåra besvär av trötthet bland både män och kvinnor i arbetaryrken än bland dem i tjänstemannaryrken på mellannivå eller högre.


## Ekonomisk situation



**Figur 19.** Andel med svåra besvär av trötthet efter ekonomisk situation, 16-84 år, 2007. Åldersstandardiserat. Källa: Nationella folkhälsoenkäten, *Hälsa på lika villkor?*, Statens folkhälsoinstitut.

Det var vanligare med svåra besvär av trötthet bland kvinnor och män som var ekonomiskt utsatta än bland dem som inte varit ekonomiskt utsatta.

## Utbildning




**Figur 20** Andel med svåra besvär av trötthet efter utbildning, 16-84 år, 2007. Åldersstandardiserat. Källa: Nationella folkhälsoenkäten, *Hälsa på lika villkor?*, Statens folkhälsoinstitut.

Det var vanligare med svåra besvär av trötthet bland kvinnor med kort utbildning än bland kvinnor med lång utbildning. Det fanns inga statistiskt säkerställda skillnader mellan män i olika utbildningsgrupper.

## Födelseland


Andel med svåra besvär av trötthet (%)



**Figur 21.** Andel med svåra besvär av trötthet efter födelseland, 16-84 år, 2007. Åldersstandardiserat.  
Källa: Nationella folkhälsoenkäten, *Hälsa på lika villkor?*, Statens folkhälsoinstitut.

Det var vanligare med svåra besvär av trötthet bland män och kvinnor födda utanför Norden än bland män och kvinnor födda i Sverige.


## Svåra sömnbesvär



**Figur 22.** Andel med svåra sömnbesvär, 16-84 år (2004 18-84 år), 2004-2007. Åldersstandardiserat. Källa: Nationella folkhälsoenkäten, *Hälsa på lika villkor?*, Statens folkhälsoinstitut.

Det fanns inga statistiskt säkerställda skillnader mellan åren. Det var vanligare med svåra sömnbesvär bland kvinnor än bland män alla år.


## Ålder



**Figur 23.** Andel med svåra sömnbesvär i olika åldersgrupper, 16-84 år, 2007. Källa: Nationella folkhälsoenkäten, *Hälsa på lika villkor?*, Statens folkhälsoinstitut.

Det var vanligare med svåra sömnbesvär bland kvinnor i åldersgruppen 45-64 år än bland kvinnor i övriga åldersgrupper. Det fanns inga statistiskt säkerställda skillnader mellan män i olika åldersgrupper.


## Sysselsättning



**Figur 24.** Andel med svåra sömnbesvär efter sysselsättning, 16-84 år, 2007. Åldersstandardiserat. Källa: Nationella folkhälsoenkäten, *Hälsa på lika villkor?*, Statens folkhälsoinstitut.

Det var mindre vanligt med svåra sömnbesvär bland yrkesarbetande kvinnor och män i jämförelse med kvinnor och män i övriga sysselsättningsgrupper. Det var även mindre vanligt med svåra sömnbesvär bland arbetslösa kvinnor än bland kvinnor med sjuk-/aktivitetsersättning.


## Socioekonomi



**Figur 25.** Andel med svåra sömnbesvär efter socioekonomi, 16-84 år, 2007. Åldersstandardiserat. Källa: Nationella folkhälsoenkäten, *Hälsa på lika villkor?*, Statens folkhälsoinstitut.

Det var vanligare med svåra sömnbesvär bland kvinnor och män i arbetaryrken än bland kvinnor och män i tjänstemannayrken på mellannivå eller högre.


## Ekonomisk situation



**Figur 26.** Andel med svåra sömnbesvär efter ekonomisk situation, 16-84 år, 2007. Åldersstandardiserat. Källa: Nationella folkhälsoenkäten, *Hälsa på lika villkor?*, Statens folkhälsoinstitut.

Det var vanligare med svåra sömnbesvär bland ekonomiskt utsatta kvinnor och män än bland dem som inte varit ekonomiskt utsatta.

## Utbildning




**Figur 27.** Andel med svåra sömnbesvär efter utbildning, 16-84 år, 2007. Åldersstandardiserat. Källa: Nationella folkhälsoenkäten, *Hälsa på lika villkor?*, Statens folkhälsoinstitut.

Det var vanligare att ha svåra sömnbesvär bland kvinnor med kort utbildning än bland kvinnor med lång utbildning. Det fanns inga statistiskt säkerställda skillnader mellan olika utbildningsnivå för män med svåra sömnbesvär.

## Födelseland


Andel med svåra sömnbesvär (%)



**Figur 28.** Andel med svåra sömnbesvär efter födelseland, 16-84 år, 2007. Åldersstandardiserat. Källa: Nationella folkhälsoenkäten, *Hälsa på lika villkor?*, Statens folkhälsoinstitut.

Det var vanligare med svåra sömnbesvär bland kvinnor födda utanför Europa än bland kvinnor födda inom Norden. Det fanns inga statistiska säkerställda skillnader mellan olika födelseland för män med svåra sömnbesvär.


## Stress



**Figur 29.** Andel som känt sig ganska eller mycket stressade, 16-84 år (2004 18-84 år), 2004-2007. Källa: Nationella folkhälsoenkäten, *Hälsa på lika villkor?*, Statens folkhälsoinstitut.

Det var mindre vanligt, bland män, att känna sig ganska eller mycket stressade år 2006 och år 2007 jämfört med år 2004. Bland kvinnor var det mindre vanligt att känna sig stressade 2007 än bland kvinnor år 2004. Kvinnor kände sig i större utsträckning ganska eller mycket stressade alla år jämfört med männen.


## Ålder



**Figur 30.** Andel som känt sig ganska eller mycket stressade i olika åldersgrupper, 16-84 år, 2007. Källa: Nationella folkhälsoenkäten, *Hälsa på lika villkor?*, Statens folkhälsoinstitut.

Det var vanligare att ha känt sig ganska eller mycket stressade bland kvinnor och män i åldersgruppen 16-64 år än bland dem i åldern 65-84 år. Det var vanligare bland unga kvinnor (16-29 år) att ha känt sig ganska eller mycket stressade i jämförelse med kvinnor i åldrarna 45-64 år.


## Sysselsättning



**Figur 31.** Andel som känt sig ganska eller mycket stressade efter sysselsättning, 16-84 år, 2007. Åldersstandardiserat. Källa: Nationella folkhälsoenkäten, *Hälsa på lika villkor?*, Statens folkhälsoinstitut.

Det var vanligare bland kvinnor och män som var arbetslösa och dem med sjuk-/aktivitetsersättning att ha känt sig ganska eller mycket stressade i jämförelse med yrkesarbetande kvinnor och män. Det var vanligare bland långtidssjukskrivna män att ha känt sig ganska eller mycket stressade i jämförelse med yrkesarbetande män.


## Socioekonomi



**Figur 32.** Andel som känt sig ganska eller mycket stressade efter socioekonomi, 16-84 år, 2007. Åldersstandardiserat. Källa: Nationella folkhälsoenkäten, *Hälsa på lika villkor?*, Statens folkhälsoinstitut.

Det fanns inga statistiskt säkerställda skillnader mellan olika socioekonomiska grupper för dem som kände sig ganska eller mycket stressade.


## Ekonomisk situation



**Figur 33** Andel med att de känner sig ganska eller mycket stressade efter ekonomisk situation, 16-84 år, 2007. Åldersstandardiserat. Källa: Nationella folkhälsoenkäten, *Hälsa på lika villkor?*, Statens folkhälsoinstitut.

Det var vanligare bland ekonomiskt utsatta kvinnor och män att ha känt sig ganska eller mycket stressade än bland kvinnor och män som inte varit ekonomiskt utsatta.


## Utbildning



**Figur 34.** Andel som känt sig ganska eller mycket stressade efter utbildning, 16-84 år, 2007. Åldersstandardiserat. Källa: Nationella folkhälsoenkäten, *Hälsa på lika villkor?*, Statens folkhälsoinstitut.

Det var vanligare bland män med kort utbildning att ha känt sig ganska eller mycket stressade än bland män med lång utbildning. Det fanns inga statistiskt säkerställda skillnader mellan kvinnor med olika utbildningslängd.


## Födelse land



**Figur 35.** Andel som känt sig ganska eller mycket stressade efter födelse land, 16-84 år, 2007. Åldersstandardiserat. Källa: Nationella folkhälsoenkäten, *Hälsa på lika villkor?*, Statens folkhälsoinstitut.

Det var vanligare bland män födda i övriga världen att ha känt sig ganska eller mycket stressade än bland män födda inom Europa. Det fanns inga statistiskt säkerställda skillnader mellan kvinnor födda i olika delar av världen.


## Nedsatt psykiskt välbefinnande



**Figur 36.** Andel med nedsatt psykiskt välbefinnande (GHQ12, cut-off 3), 16-84 år (2004 18-84 år), 2004-2007. Åldersstandardiserat. Källa: Nationella folkhälsoenkäten, *Hälsa på lika villkor?*, Statens folkhälsoinstitut.

Det var mindre vanligt med nedsatt psykiskt välbefinnande bland kvinnor och män år 2007 än år 2004. Det var vanligare med nedsatt psykiskt välbefinnande bland kvinnor än bland män alla år.


## Ålder



**Figur 37.** Andel med nedsatt psykiskt välbefinnande (GHQ12, cut-off 3) i olika åldersgrupper, 16-84 år, 2007. Källa: Nationella folkhälsoenkäten, *Hälsa på lika villkor?*, Statens folkhälsoinstitut.

Det var vanligare med nedsatt psykiskt välbefinnande bland kvinnor och män i åldrarna 16-44 år än i åldersgruppen 65-84 år. Bland kvinnor i åldrarna 16-44 år var det även vanligare med nedsatt psykiskt välbefinnande än i åldersgruppen 45-64 år.


## Sysselsättning



**Figur 38.** Andel med nedsatt psykiskt välbefinnande (GHQ12, cut-off 3) efter sysselsättning, 16-84 år, 2007. Åldersstandardiserat. Källa: Nationella folkhälsoenkäten, *Hälsa på lika villkor?*, Statens folkhälsoinstitut.

Det var vanligare med nedsatt psykiskt välbefinnande bland kvinnor och män som var arbetslösa, hade sjuk-/aktivitetsersättning eller var långtidssjukskrivna än bland yrkesarbetande kvinnor och män .


## Socioekonomi



**Figur 39.** Andel med nedsatt psykiskt välbefinnande (GHQ12, cut-off 3) efter socioekonomi, 16-84 år, 2007. Åldersstandardiserat. Källa: Nationella folkhälsoenkäten, *Hälsa på lika villkor?*, Statens folkhälsoinstitut.

Det var vanligare med nedsatt psykiskt välbefinnande bland kvinnor i arbetaryrken än bland kvinnor i tjänstemannaryrken på mellannivå eller högre. Det fanns inga statistiskt säkerställda skillnader mellan män i olika socioekonomiska grupper.


## Ekonomisk situation



**Figur 40.** Andel med nedsatt psykiskt välbefinnande (GHQ12, cut-off 3) efter ekonomisk situation, 16-84 år, 2007. Åldersstandardiserat. Källa: Nationella folkhälsoenkäten, *Hälsa på lika villkor?*, Statens folkhälsoinstitut.

Det var vanligare med nedsatt psykiskt välbefinnande bland ekonomiskt utsatta kvinnor och män än bland dem som inte varit ekonomiskt utsatta.


## Utbildning



**Figur 41.** Andel med nedsatt psykiskt välbefinnande (GHQ12, cut-off 3) efter utbildning, 16-84 år, 2007. Åldersstandardiserat. Källa: Nationella folkhälsoenkäten, *Hälsa på lika villkor?*, Statens folkhälsoinstitut.

Det var vanligare med nedsatt psykiskt välbefinnande bland män med kort utbildning än bland män med lång utbildning. Det fanns inga statistiskt säkerställda skillnader mellan kvinnor med olika utbildningslängd.

## Födelseland




**Figur 42.** Andel med nedsatt psykiskt välbefinnande (GHQ12, cut-off 3) efter födelseland, 16-84 år, 2007. Åldersstandardiserat. Källa: Nationella folkhälsoenkäten, *Hälsa på lika villkor?*, Statens folkhälsoinstitut.

Det var vanligare med nedsatt psykiskt välbefinnande bland män födda utanför Norden än bland svenska män. Det fanns inga statistiskt säkerställda skillnader mellan kvinnor födda i olika länder.

## Självordstankar

Andel med självmordstankar (%)




**Figur 50.** Andel som en eller flera gånger har haft självmordstankar, 16-84 år, 2005-2007. Åldersstandardiserat. Källa: Nationella folkhälsoenkäten, *Hälsa på lika villkor?*, Statens folkhälsoinstitut.

Det fanns inga statistiskt säkerställda skillnader i andelen kvinnor och män som haft självmordstankar vare sig mellan åren eller mellan kvinnor och män.

## Ålder


Andel med självmordstankar (%)



**Figur 51.** Andel som en eller flera gånger har haft självmordstankar i olika åldersgrupper, 16-84 år, 2007. Källa: Nationella folkhälsoenkäten, *Hälsa på lika villkor?*, Statens folkhälsoinstitut.

Det var mindre vanligt med självmordstankar bland kvinnor och män i åldersgruppen 65-84 år än i övriga åldersgrupper. Det var vanligare med självmordstankar bland kvinnor i åldersgrupperna 16-29 än bland kvinnor i åldern 45-84 år.


## Sysselsättning



**Figur 52.** Andel som en eller flera gånger har haft självmordstankar efter sysselsättning, 16-84 år, 2007. Åldersstandardiserat. Källa: Nationella folkhälsoenkäten, *Hälsa på lika villkor?*, Statens folkhälsoinstitut.

Det var mindre vanligt med självmordstankar bland yrkesarbetande kvinnor och män i jämförelse med kvinnor och män i övriga sysselsättningsgrupper.


## Socioekonomi



**Figur 53.** Andel som en eller flera gånger har haft självmordstankar efter socioekonomi, 16-84 år, 2007. Åldersstandardiserat. Källa: Nationella folkhälsoenkäten, *Hälsa på lika villkor?*, Statens folkhälsoinstitut.

Det fanns inga statistiskt säkerställda skillnader mellan olika socioekonomiska grupper för dem som haft självmordstankar


## Ekonomisk situation



**Figur 54.** Andel som en eller flera gånger har haft självmordstankar efter ekonomisk situation, 16-84 år, 2007. Åldersstandardiserat. Källa: Nationella folkhälsoenkäten, *Hälsa på lika villkor?*, Statens folkhälsoinstitut.

Det var vanligare med självmordstankar bland ekonomiskt utsatta kvinnor och män än bland kvinnor och män som inte varit ekonomiskt utsatta.

## Utbildning




**Figur 55.** Andel som en eller flera gånger har haft självmordstankar efter utbildning, 16-84 år, 2007. Åldersstandardiserat. Källa: Nationella folkhälsoenkäten, *Hälsa på lika villkor?*, Statens folkhälsoinstitut.

Det fanns inga statistiskt säkerställda skillnader mellan olika utbildningsnivåer för dem som haft självmordstankar.

## Födelseland

Andel med självmordstankar (%)




**Figur 56** Andel som en eller flera gånger har haft självmordstankar efter födelseland, 16-84 år, 2007. Åldersstandardiserat. Källa: Nationella folkhälsoenkäten, *Hälsa på lika villkor?*, Statens folkhälsoinstitut.

Det fanns inga statistiskt säkerställda skillnader mellan olika födelseland för dem som haft självmordstankar.

## Självordsförsök

Andel som försökt ta sitt liv (%)




**Figur 57.** Andel som en eller flera gånger har försökt ta sitt liv, 16-84 år, 2005-2007. Åldersstandardiserat. Källa: Nationella folkhälsoenkäten, *Hälsa på lika villkor?*, Statens folkhälsoinstitut.

En större andel kvinnor än män hade försökt ta sitt liv alla år. Det fanns inga statistiskt säkerställda skillnader mellan åren.

## Ålder


Andel som försökt ta sitt liv (%)



**Figur 58.** Andel som en eller flera gånger har försökt ta sitt liv i olika åldersgrupper, 16-84 år, 2007. Källa: Nationella folkhälsoenkäten, *Hälsa på lika villkor?*, Statens folkhälsoinstitut.

Det var mindre vanligt bland kvinnor i åldersgruppen 65-84 år att en eller flera gånger ha försökt ta sitt liv i jämförelse med övriga åldersgrupper. Det fanns inga statistiskt säkerställda skillnader mellan män i olika åldersgrupper.


## Sysselsättning



**Figur 59.** Andel som en eller flera gånger har försökt ta sitt liv efter sysselsättning, 16-84 år, 2007. Åldersstandardiserat. Källa: Nationella folkhälsoenkäten, *Hälsa på lika villkor?*, Statens folkhälsoinstitut.

Det var vanligare att en eller flera gånger ha försökt ta sitt liv bland kvinnor och män med sjuk-/aktivitetsersättning än bland dem som yrkesarbetade. Det var vanligare att ha försökt ta sitt liv bland långtidssjukskrivna män och arbetslösa kvinnor än bland yrkesarbetande kvinnor och män. Gruppen långtidssjukskrivna män är dock liten och andelen blir därmed något osäker.


## Socioekonomi



**Figur 60.** Andel som en eller flera gånger har försökt ta sitt liv efter socioekonomi, 16-84 år, 2007. Åldersstandardiserat. Källa: Nationella folkhälsoenkäten, *Hälsa på lika villkor?*, Statens folkhälsoinstitut.

Det var vanligare att en eller flera gånger ha försökt ta sitt liv bland kvinnor i arbetaryrken än bland kvinnor i tjänstemannayrken på mellannivå eller högre. Det fanns inga statistiskt säkerställda skillnader mellan män i olika socioekonomiska grupper.


## Ekonomisk situation



**Figur 61.** Andel som en eller flera gånger har försökt ta sitt liv efter ekonomisk situation, 16-84 år, 2007. Åldersstandardiserat. Källa: Nationella folkhälsoenkäten, *Hälsa på lika villkor?*, Statens folkhälsoinstitut.

Det var vanligare att en eller flera gånger har försökt ta sitt liv bland kvinnor och män som varit ekonomiskt utsatta än bland dem som inte varit ekonomiskt utsatta.


## Utbildning



**Figur 62.** Andel som en eller flera gånger har försökt ta sitt liv efter utbildning, 16-84 år, 2007. Åldersstandardiserat. Källa: Nationella folkhälsoenkäten, *Hälsa på lika villkor?*, Statens folkhälsoinstitut.

Det var vanligare att ha försökt ta sitt liv bland kvinnor med kort utbildning än bland kvinnor med lång utbildning. Det fanns inga statistiskt säkerställda skillnader mellan män med olika utbildningsnivå.

## Födelseland



**Figur 63.** Andel som en eller flera gånger har försökt ta sitt liv efter födelseland, 16-84 år, 2007. Åldersstandardiserat. Källa: Nationella folkhälsoenkäten, *Hälsa på lika villkor?*, Statens folkhälsoinstitut.

Det var vanligare att en eller flera gånger ha försökt ta sitt liv bland män födda utanför Europa än bland svenskfödda män. Det fanns inga statistiskt säkerställda skillnader mellan kvinnor födda i olika länder.